DIAGNÓSTICO

REQUIERE 2 DE 3 CARACTERÍSTICAS

- **Fosfatasa alcalina (FA) elevada**
- **Anticuerpo antimitocondrial (AAM) positivo o anticuerpo antinuclear (ANA) específico de CBP**
- **Biopsia de hígado**

La colangitis biliar primaria (CBP) es una enfermedad hepática autoinmunitaria global que afecta predominantemente a mujeres de todas las razas y orígenes étnicos. **El diagnóstico temprano es clave para el éxito con las terapias actuales.**

La CBP afecta a aproximadamente 10 mujeres por cada hombre.
La CBP normalmente no se produce en la niñez.

TRATAMIENTO

AUDC Ácido ursodesoxicólico

AOC Ácido obeticólico



[1] La monoterapia con AOC es una opción para los pacientes que no puenes tolerar el AUDC. [2] Hay nuevas terapias en ensayos clínicos. [3] El AOC está contraindicado para pacientes que tienen cirrosis avanzada.

ACERCA DE PBCers

Somos una organización que apoya a los pacientes con colangitis biliar primaria a lo largo de su trayectoria. Uno de los motivos principales por los que enfatizamos la educación y el apoyo es reforzar las relaciones entre proveedores y pacientes, porque un paciente informado y respaldado es un paciente que cumple con los requisitos y está capacitado.

Ofrecemos educación y apoyo a los pacientes con colangitis biliar primaria, familiares y amigos, y reunimos fondos para ayudar a investigar las causas y descubrir una cura para la CBP.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

pbcers@pbcers.org
(346) 302-1620
1014A Greenleaf Rd., Rochester, NY 14612

ÚNASE HOY MISMO

PBCers EXISTE DE MODO QUE NADIE SE SIENTA SOLO

- **Únase a nuestro resumen por correo electrónico de CBP**
- **Asista a una conferencia de CBP o reunión local**
- **Síganos en Facebook y Twitter**

http://pbcers.org facebook.com/PBCersOrg
@pbcers healthunloced.com/PCBers
https://pbcers.groups.io/g/PBCersdigest/

LA GUÍA DE PBCers PARA LA

COLANGITIS BILIAR PRIMARIA (CBP)

PBCers Organization

¿QUÉ ES LA CBP?

La colangitis biliar primaria es una enfermedad hepática autoinmunitaria causada por un ataque inmunitario contra las células que recubren las vías biliares pequeñas a medianas.

Al igual que todas las enfermedades autoinmunes, los pacientes que tienen CBP son propensos a tener otras enfermedades autoinmunes, como enfermedad de Raynaud, hipotiroidismo, síndrome de Sjögren, esclerodermia, artritis y esprúe celíaco.



PATOLOGÍA DE LA CBP



La CBP solía referirse a la "cirrosis biliar primaria", pero la palabra "cirrosis" fue problemática porque 1) tenía connotaciones negativas que estigmatizaban indebidamente a los pacientes, 2) era un término inexacto para la mayoría de los pacientes que tienen CBP que no progresaron a cirrosis y 3) no comunicó la capacidad de las terapias actuales para prevenir la progresión a cirrosis.

La sigla CBP significa ahora COLANGITIS BILIAR PRIMARIA

CURSO DE CBP SIN TRATAR

PRECLÍNICO ASINTOMÁTICO

ASINTOMÁTICO

SINTOMÁTICO

AVANZADO

TRASPLANTE DE HÍGADO



Toxicidad de ácido biliar por colestasis progresiva

Disminución de la función hepática
Fibrosis biliar progresiva

Cirrosis biliar

SÍNTOMAS

FATIGA

A menudo, es el primer síntoma que los pacientes advierten, lo que los incita a visitar a un profesional.

PICAZÓN

A menudo, comienza con las manos y los pies, pero puede ser generalizada y constante.

SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS CONCOMITANTES

- Ojos secos
- Boca seca
- Dispepsia
- Reflujo
- Oscurecimiento de la piel
- Deposiciones grasas
- Dolor abdominal
- Dolor artrítico

	PRECLÍNICO ASINTOMÁTICO	ASINTOMÁTICO	SINTOMÁTICO	AVANZADO	TRASPLANTE DE HÍGADO
AUTOINMUNIDAD DE LA CBP AMA + ≥95 % ANA ±, SMA ±	•	•	•	•	•
ENFERMEDADES AUTOINMUNITARIAS CONCOMITANTES	•	•	•	•	•
SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LA CBP Fatiga, picazón (no relacionada con la gravedad de la enfermedad)	•	•	•	•	•
COMPLICACIONES Colesterol alto Osteoporosis	•	•	•	•	•
Enfermedad avanzada Vitamina A, D, E, K Deficiencia; selección necesaria para el carcinoma hepatocelular (CHC)				•	•
				•	•